

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ПАНТЕНОЛ-РАПІОФАРМ**  
**(PANTHENOL-RATIOPHARM®)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* декспантенол;

100 г мазі містить 5 г декспантенолу;

*допоміжні речовини:* калію сорбат, ланолін, ланоліновий спирт, парафін білий м'який, тригліцериди середнього ланцюга, ізооктадеканолдигліцеролсукцинат, натрію цитрат, кислоти лимонної моногідрат, вода очищена.

**Лікарська форма.**

Мазь.

Білого або жовтуватого кольору однорідна мазь, що легко наноситься з характерним запахом ланоліну.

**Назва і місце знаходження виробника.**

Меркле ГмбХ. Людвіг-Меркле-Штрассе 3, 89143 Блаубойрен, Німеччина; вул. Граф-Арко 3, 89079 Ульм, Німеччина.

**Фармакотерапевтична група.**

Препарати, що сприяють загоєнню ран. Код АТХ D03AX03.

Декспантенол – попередник пантотенової кислоти і має таку ж саму біологічну дію, як і пантотенова кислота. Пантотенова кислота та її похідні є водорозчинними вітамінами, які є складовою частиною коферменту А, який у вигляді коферменту ацетил-КоА бере участь у клітинному метаболізмі. Пантотенова кислота необхідна для формування і регенерації шкіри і слизових оболонок. При зовнішньому застосуванні декспантенол/пантенол прискорює процеси епітелізації та рубцювання пошкодженої шкіри і слизових оболонок.

Пантотенова кислота та її похідні нетоксичні. Немає відомостей щодо мутагенної, тератогенної або канцерогенної дії препарату.

Декспантенол добре проникає у клітини шкіри і слизової оболонки, де перетворюється у пантотенову кислоту. Пантотенова кислота, що потрапила у системний кровотік, накопичується у тканинах організму, не метаболізується і виводиться у незміненому вигляді (60-70 % з сечею, решта – з калом).

**Показання для застосування.**

Препарат застосовують у наступних випадках:

- для прискорення загоєння та епітелізації шкіри при мікропошкодженнях (нетяжкі опіки та подрипини); при подразненнях шкіри (наприклад, унаслідок радіотерапії, фототерапії або опромінення ультрафіолетовими променями); при хронічних виразках шкіри та пролежнях;
- для профілактики та лікування потрісканої або шершавої та сухої шкіри;
- для регулярного профілактичного догляду за молочними залозами жінок, які годують груддю, та для лікування подразнень та тріщин сосків;
- для догляду за немовлятами: профілактика та лікування пелюшкового дерматиту;
- для обробки шкіри пацієнтів під час та після місцевого застосування кортикостероїдів.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

При застосуванні препарату слід уникати контакту з очима.

Мазь не можна наносити на мокнучі рани.

При застосуванні мазі на ділянках статевих органів і заднього проходу та одночасному використанні презерватива, може зменшитися його міцність і, відповідно, безпека застосування останнього.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Немає жодних підстав вважати, що застосування препарату на шкірно у період вагітності або годування груддю є ризикованим. Протягом вагітності препарат слід застосовувати за призначенням лікаря.

При застосуванні препарату для лікування тріщин сосків перед годуванням дитини необхідно зібрати залишки засобу за допомогою серветки, промити сосок шкіру навколо теплою кип'яченою водою.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Препарат застосовують дітям різних вікових груп, включаючи немовлят.

**Спосіб застосування та дози.**

*Лікування поверхневих ран будь-якого походження та профілактика потрісканої, сухої або шершавої шкіри:* мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1 або кілька разів на добу залежно від необхідності.

*Догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю:* наносити мазь на соски після кожного годування груддю.

*Лікування дефектів слизової оболонки шийки матки:* застосовувати мазь 1 або кілька разів на добу під наглядом лікаря.

*Догляд за немовлятами:* застосовувати мазь після кожної зміни підгузника (пелюшок).

Тривалість застосування визначається лікарем індивідуально залежно від виду та перебігу захворювання.

Для застосування на мокнучих ранах, незахищених поверхнях шкіри (обличчя) та волосистій шкірі краще застосовувати декспантенол у вигляді крему, оскільки він має менше жиру та швидше проникає у шкіру.

**Передозування.**

Декспантенол зазвичай добре переноситься і, таким чином, у літературі розглядається як нетоксичний. Гіпервітаміноз не описаний.

**Побічні ефекти.**

У поодиноких випадках спостерігаються реакції підвищеної чутливості, включаючи алергічний дерматит, свербіж, еритему, екзантему, висипання, кропив'янку, подразнення шкіри, запалення та пухирці. Ланолін, що міститься у складі препарату, може викликати місцеві алергічні реакції (наприклад контактний дерматит).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Пантенол може посилювати дію деполаризуючих міорелаксантів (суксаметонію хлориду, декаметонію броміду) та послаблювати дію недеполаризуючих міорелаксантів завдяки здатності стимулювати синтез ацетилхоліну.

**Термін придатності.** 3 роки.

Після першого відкриття – 12 місяців.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 35 г мазі у тубі; по 1 тубі у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

«Представник в Україні, Азербайджані, Грузії, Вірменії й Молдові - ТОВ "Тева Україна", тел. +38 044 240 17 67, [www.teva.ua](http://www.teva.ua)»